

Beifuß-Ambrosie – Verwechslungsmöglichkeiten

Beifuß-Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia*) im Laufe ihres Entwicklungszyklus:



Keimling



Jungpflanze



vor Schieben Blütenstand¹



Blühende männliche Blütenstände

Die Beifuß-Ambrosie kann mit einer Reihe von Pflanzen verwechselt werden. Die meisten **Verwechslungen** betreffen den **Gemeinen Beifuß** (*Artemisia vulgaris*).



Blattoberseiten



Blattunterseiten

Jeweils links: Gemeiner Beifuß; jeweils rechts: Beifuß-Ambrosie



Keimling des Gemeinen Beifuß²



Blütenstände des Gemeiner Beifuß

Wichtige Unterscheidungsmerkmale:

Merkmal	Gemeiner Beifuß	Beifuß-Ambrosie
Blätter	Unterseite heller, silbrig-weiß gefärbt	Beidseitig grün
Stängel	Unbehaart	Behaart, grün, Rotfärbung im Herbst
Entwicklung	Schneller (Ende Mai ca. 25-50 cm)	Langsam (Ende Mai ca. 10-20 cm)
Blühbeginn	Ab Ende Juni	Ab Mitte Juli
Blütenstand	Pyramidenförmiger Blütenstand	Längliche männliche Blüten traubenförmig an Triebende, gelblich bei Pollenbildung

Weitere oft auftretende Verwechslungen zu:



Weißer Gänsefuß
(*Chenopodium album*)

ungeteilte Blätter, regelmäßig bis unregelmäßig gezähnt, unbehaart. Blütenstand vielästig.



Zurückgebogener Amaranth
(*Amaranthus retroflexus*)

eiförmige, ungefiederte Blätter. Stängel, Blattstiele und -unterseite teils rot-violett gefärbt. Dichte Blütenähren.



Hundspetersilie
(*Aethusa cynapium*)

Laubblätter zwei- bis dreifach gefiedert mit fiederspaltigen, spitzen Blättchen. Blüten weiß, Blütenstand doldenförmig.

